

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон
қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт,
филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия
этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

**2021-8
Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2021

Бош мұхаррир:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Бош мұхаррир ўринбосари:

Хасанов Шодлик Бекпұлатович, к.ф.н., к.и.х.

Таҳрир ҳайати:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Абдуллаев Баҳром Исмоилович, ф-м.ф.д.

Абдуллаев Равшан Бабажонович, тиб.ф.д., проф.

Абдуҳалимов Баҳром Абдурахимович, т.ф.д., проф.

Аимбетов Нагмет Каллиевич, и.ф.д., акад.

Бабаджанов Хүшнұт, ф.ф.н., проф.

Бекчанов Даврон Жуманазарович, к.ф.д.

Давлетов Санжар Раждабович, тар.ф.д.

Дурдиева Гавҳар Салаевна, арх.ф.д.

Дўсчанов Бахтиёр, тиб.ф.д., проф.

Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович, к.ф.д., акад.

Жуманиёзов Зоҳид Отабоевич, ф.ф.н., доц.

Кадиров Шавкат Юлдашевич, қ/х.ф.н.

Кутлиев Учқун Отобоевич, ф-м.ф.д.

Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф.

Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф.

Мирзаев Сирожиддин Зайнисевич, ф-м.ф.д., проф.

Рахимов Рахим Атажанович, т.ф.д., проф.

Рашидов Негмурод Элмурович, б.ф.н., доц.

Рӯзибоев Рашид Юсупович, тиб.ф.д., проф.

Рӯзметов Бахтияр, и.ф.д., проф.

Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад.

Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф.

Сирожов Ойбек Очилович, с.ф.д., проф.

Сотипов Гойиназар, қ/х.ф.д., проф.

Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, б.ф.д., академик

Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д.

Чўпонов Отаназар Отожсонович, ф.ф.д., доц.

Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д., проф.

Эрматова Жамила Исмаиловна, ф.ф.н., доц.

Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., доц.

Ўразбоев Гайрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д.

Ўрзобоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д.

Ҳажсиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д.

Хасанов Шодлик Бекпұлатович, к.ф.н., к.и.х.

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№5 (79), Хоразм Маъмун академияси, 2021 й. – 322 б. – Босма нашрнинг электрон варианти - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм Маъмун академияси

МУНДАРИЖА АРХИТЕКТУРА

Setmamatov M.B., Madirimov X.A., Imamov Q.T. Qadimgi Xorazm madaniy yodgorliklari. Misdaxkan majmuasi tahlili	6
Setmamatov M.B., Baydjanov A.Q., Madirimov X.A. Qadimgi Xorazm. Misdaxkan majmuasidagi xalifa Erejep maqbarasi	9

БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Bekchanov M.X., Bekchanov N.X. Xorazm vohasi “Faunani saqlash” MCHJ hududidagi qattiq qanotlilar (Coleoptera) turkumi ayrim vakillarining uchrashi va bioekologik xususiyatlari	13
Doniyorov B.N. Buxoro viloyatida ko’k kaptar (Columba livia neglecta Hume, 1873) ning biologiyasiga doir materiallar	17
Абдуллаев Ў.Р., Жуманазаров Х.Ў., Искандаров А.И., Абдуллаев И.И. Хоразм воҳаси ҳақиқий арилар (Hymenoptera: Vespidae) фаунасининг ареологик таҳлили	22
Абдурасулова С., Авзметова И., Пазилов А., Базарова Р. Ўзбекистонда адвентив -Deroceras reticulatum (Gastrapoderestria Nuda) турининг тарқалиши ва хўжалик аҳамияти	25
Азимов И.Т. Курама ва Чотқол тоғ тизмасидаги кенг баргли дараҳт ва бутазорларнинг ҳозирги экологик холати	29
Болтаев К.С., Жамалова Ф.А., Мамарасулова Н.И. Экологическое группирование нематодофауны тугайных растений	33
Ортиков Э.А., Махмуджанов Д.И., Азизова Ф.А. Ўзбекистонда тарқалган Limniris ва Iris ост туркуми (Iris L.) турларининг кисқача морфологик ва биогеографик таҳлили	37
Ражабов Т.Ф. Зираубулок-Зиёвуддин тоғлари ўсимликлар қопламининг флористик ва ценотик хусусиятлари	39
Рахмонов Р.Р., Райимов А.Р., Рахимов Ж.Р., Туева Г.У. Бухоро вилоятида овланадиган сут эмизувчиларнинг таксономик таҳлили	44
Рўзметов Р.С., Матякубов З.Ш., Абдуллаев И.И., Ибрагимов Ш.Б., Олланазаров С.Б. Биноларда термитларнинг тарқалишига таъсир қилувчи омиллар	47

ҚИШЛОҚ ҲУЖАЛИК ФАНЛАРИ

Artikova Н.Т., Salimova Н.Х. Buxoro viloyati sug’oriladigan tuproqlarning meliorativ holati va unga ta’sir etuvchi omillar	51
Khudoiberdiyev F.Sh., Bobojonov S.U., Mukhamadov K.M. Current situation of pasture use in Bukhara region	54
Мурадуллаев А.М., Раҳмонқулов С., Исламов А.М., Абдурасулов Ш.Э. Fўза нав ва тизмалари тола чиқишига юқори ҳароратнинг таъсири	56
Намазов Ш.Э., Матёқубов С.К. Интрогрессив fўза тизмалари иштироқида чатиштириб олинган F ₁ -F ₄ дурагайларида тола узунлигининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги	61
Намазов Ш.Э., Матёқубов С.К. Интрогрессив fўза тизмаларида эртапишарликнинг ўзгарувчанлиги	63
Рахмонов Ш.Т. Экономико-географическое особенности сельского хозяйства северного Таджикистана в условиях трансформируемой экономики	66
Розиков Ж.М. Мева-сабзавотчилик кластерларини бошқаришни ташкилий механизмини такомиллаштириш	70
Худайбергенова Н.Б., Реимов Н.Б., Реймов О.Н. Орол бўйида сув танқислиги шароитида дехқончиликни юритиш	72
Эргашев О.Р. Fўза шаклларининг бир неча авлод ўсимликларида хўжалик белгилари кўрсаткичларини намоён бўлишини ўрганиш	75

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Abdullaev A., Rakhimova M., Obidova M., Shoalimova D. The impact of Covid-19 to the tourism industry mainly to the hotel Sphere in Uzbekistan	79
Ashurbaev O.A., Akabirova A.A., Mirfayazov M.M. The role of integrated marketing communications on the example of restaurant «Brasserie on the park»	82
Kasimov A., Kasimov A., Ergasheva N., Karimova S., Arifov A. Hospitality or tourism?	86
Абдубоситова Б., Бахрамова Ш. Маркетинговое исследование по улучшению услуг Ташкентского зоопарка	93
Алиева Э.А. Оценка инновационного потенциала предприятия на основе стоимостного подхода	96
Ашрапова М.Х., Курбонова З.К., Умаров М.Х. Коммуникации, продвижение и бренд в сельском туризме	99
Ашурбаев О., Абдусаидов С., Хасанов Р. Анализ общепита. Исследования кофеен и ее целевой аудитории	104

КИШЛОҚ ХҮЖАЛИГИ

UO'T:631,4

**BUXORO VILOYATI SUG'ORILADIGAN TUPROQLARNING MELIORATIV HOLATI
VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR**

*H.T.Artikova, prof., DSc, Buxoro Davlat Universiteti, Buxoro
H.X.Salimova, mustaqil izlanuvchi, Buxoro Davlat Universiteti, Buxoro*

Annotasiya. Maqolada Buxoro viloyati sug'oriladigan tuproqlarining meliorativ holati, tuproqlarning paydo bo'lishi va rivojlanish sharoitlari, sho'rланishning turi, sho'rланishni oldini olish maqsadida qollaniladigan agrotexnik va meliorativ tadbirlar komplteksi to'grisida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: sug'oriladigan tuproqlar, meliorativ holat, shorlanish turi, rel'yef, agrotexnik tadbir, sizot suvi, gipsli qatlama, sho'r yuvish.

Аннотация. В данной статье приводятся данные о мелиоративное состояние орошаемых почв, о образование и развитие почв, тип засоленные почв, применяемые агротехнические приёмы с целью уменьшение засоленные почвы в Бухарском области.

Ключевые слова: орошаемые почвы, мелиоративное состояние, тип засоленные, рельеф, агротехнические мероприятия, грунтовые воды, гипсовые составы, промывка засоленных почв

Abstract. The article provides information on the reclamation of irrigated soils in Bukhara region, the conditions of formation and development of soils, the type of salinity, a set of agrotechnical and meliorative measures used to prevent salinization.

Keywords: irrigated soils, reclamation, type of salinity, relief, agronomik activity, groundwater, gypsum layer, saline leaching.

Mamlakatimiz rivojlanishining yuqori bosqichiga o'tgan va dehqonchilikda jadal texnologiyalar ishlab chiqarishga joriy qilinayotgan hozirgi kunda tuproqlardan samarali foydalanish masalalari dolzarb vazifaga aylanib bormoqda. Sug'oriladigan tuproqlarni asrash, agrotexnik, agromeliorativ va boshqa tadbirlarni qo'llash orqali meliorativ va ekologik holatni sog'lomlashtirish, yer resurslaridan samarali foydalanish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, uning unumdoorligiga zarar yetkazuvchi har qanday salbiy jarayonlarni, jumladan, tuproq sho'rланishining oldini olish, keltirib chiqargan oqibatlarini bartaraf etish bugungi kunning ustivor vazifalaridan bo'lib, katta ahamiyatga ega.

Respublikada dehqonchilik qilinayotgan yerkarning unumdoorligini saqlash, oshirish, muhofaza qilish asosida uning meliorativ holatini bilish, hisobga olish va bashorat qilish tuproqlar unumdoorligini oshirishning garovi hisoblanadi. Sug'oriladigan tuproqlar meliorativ holatini yaxshilashda, avvalambor, tuproqlarning kelib chiqish qonuniyatlarini, ularni geologik-geomorfologik, gidrogeologik va ekologik holati bo'yicha to'la tasavvurga ega bo'lishi kerak, chunki tuproqlar har bir xossa-xususiyatlarining bir-biriga aloqadoligini, ularning ta'sir doirasi va tuproq qatlamlarida o'zgarish jarayonlarini o'rganish asosida, kelgusida mazkur tuproqlar sug'orish ta'sirida qanday meliorativ o'zgarishlarga uchrashini bashorat qilish mumkin, ular orqali sug'orish suvlari sifati, yerosi suvlari sathi, minerallashganlik darajasi hamda ularning o'zgarish amplitudasi anaiqlanadi.

Buxoro viloyati tekislik yerdan iborat, shimoldan janubga tomon balandlik sathi pasayib boradi. Viloyat hududlari organik tuzilishi va rel'efi, iqlim sharoiti va tuproq-o'simlik dunyosiga ko'ra bir-biridan keskin farq qilmaydi. Hududlardagi to'lqinsimon keng tekisliklar qadimgi to'rtlamchi davrning turli murakkab yotqiziqlaridan tashkil topgan. Hududlarning cho'l mintaqasida cho'l otloqi va o'tloqi cho'l tuproqlar tarqalgan bo'lib, ularning chuqur qatlamlarida to'rtlamchi davr cho'kindisi, chirirndili yotqizqlar bilan qoplangan.

Viloyat hududi murakkab organik, geomorfologik-litologik, tuproq-iqlim sharoitlari o'ta murakkab hidrogeologik holatni keltirib chiqargan, bu holat yer usti va yer osti suvlari rejimi hamda balansi ko'rsatkichlarida o'z aksini topgan.

Viloyatda tabiiy va sun'iy kam zovurlashgan tekislik qismi asosiy maydonlarida yerkarni yuqori me'yordarda sug'orish va boshqa bir qator omillar sizot suvlaringin yer yuzasiga ko'tarirlshiga imkon yaratmoqda, bu holat o'z navbatida, tuproqda tuz to'planish va qayta sho'rланish jarayonlarini keltirib chiqarmoqda. Yer osti suvlari sathining davriy ravishda tebranib turishi yil fasllari bo'yicha o'zgarib, hududlarda murakkab hidrogeologik jarayonni keltirib chiqaradi. Viloyatning shimoliy hududlarida

yer osti suvlarining sathi 2-3 m va undan ortiq chuqurlikda kuzatilsa, tekislik qismining asosiy maydonlarida 1,5-2,0 m atrofida kuzatiladi va Zarafshon daryosining 1-qayir usti terrasasida 0,5-1,0 m ni tashkil etadi. Ayniqsa, tekislikning botiq, pastqamlik yerlarida yer osti suvlari oqimi deyarli ta'minlanmaganligi natijasida suvda oson eruvchi tuzlar miqdor ortib, tuproqlar va sizot suvlaridagi dastlabki xlorid-sulfatl shor'lanish tipi xloridli shor'lanish tipiga aylanib bormoqda.

Sizot suvlarining mineralizasiya darajasi turli qismlarida turlicha ko'rsatkichlarda, shimoliy tekisliklarida 1-2 g/l atrofida kuzatilsa, hududning o'rta qismlarida 2-3 g/l, quyu pastqam yerlarda 3-5 g/l va undan ortiq miqdorni tashkil etadi. Jumladan, hudud yerlarida sizot suvlarining o'rtacha mineralishgan darajasi 1,5-2 g/l ko'rsatkichiga teng.

Sug'oriladigan yerlarda sizot suvlarining yer yuzasiga yaqinlashishi natijasida evolyutsion tarzda gidromorf (o'tloqi) tuproqlar maydoni kengayib, shor'lanish jarayoni kuchayib bormoqda. Ushbu holatlarni oldini olish va salbiy jarayonlarni to'xtatish muammosi asosiy dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Viloyat hududi organik davrlarda yotqizilgan turli jinslardan iborat bo'lib, tuproq hosil qiluvchi ona jinslari kam (kuchsiz) allyuvial jinslardan tashkil topgan. Hududning asosiy qismida tuproq hosil qiluvchi ona jinslar usti qumloqli va qumli qatlamlari bo'lgan qumoqlar allyuvial yotqiziqlarning qum aralashgan qatlamlari yodati.

Viloyat sug'oriladigan tuproqlarining shor'lanishi va ikkilamchi shor'lanishiga ta'sir etuvchi omillarning asosiysi mutazam sug'orish ishlarini olib borilishi va yer osti sizot suvlarining harakati hisoblanadi. Aksariyat hollarda sug'orishga me'yordan ortiq suv sarflanadi, sizot suvlarining harakati boshqarilmaydi, agarda sug'orish jarayonida tuproq tipi, uning mexanik tarkibi va boshqa xossalariiga bo'g'liq holda suv sarflansa hamda yer osti sizot suvlarini boshqarish tizimli yo'lga qo'yilsa hozirgidek tuproqlarning shor'lanishi tumanlar kesimida keng mashtabda uchramaydi.

1-jadval

Buxoro viloyati sug'oriladigan tuproqlarining shor'lanish holati va tavsifi

№	Tumanlar nomi	Sug'oriladigan yer maydoni, ga	Shor'langan yerlar	O'rtacha, kuchli va juda kichli shor'langan yerlar		% jami sug'oriladigan maydonlarga nisbatan	jami shor'langan maydonlarga nisbatan	%
				ga	%			
				ga	%			
1	Buxoro	22860,9	22690,7	99,3	6690,4	29,3	29,5	
2	Vobkent	20182,0	14644,8	72,6	3373,3	16,7	23,0	
3	Jondor	28070,8	28017,3	99,8	17436,1	62,1	62,2	
4	G'ijduvon	20032,0	13367,7	66,7	3326,7	16,6	24,9	
5	Kogon	16845,0	11839,2	70,3	4140,1	24,6	35,0	
6	Olot	17218,0	13233,1	76,9	8754,4	50,8	66,2	
7	Qorovulbozor	15280,0	11308,6	74,0	3676,9	24,1	32,5	
8	Qorako'l	19462,7	19105,7	98,2	7767,2	39,9	40,7	
9	Peshku	18685,0	14124,3	75,6	5849,1	31,3	41,4	
10	Romitan	22948,0	22948,0	100	9106,5	39,7	39,7	
11	Shofirkon	23054,8	20754,3	90,0	2732,4	11,9	13,2	
12	Buxoro shahri	1759,1	733,2	41,7	47,8	2,7	6,5	
	Jami	226398,3	192766,9	85,1	72901	32,2	37,8	

Sho'r yuvish samaradorligiga tuproq (mexanik tarkibi, suv-fizik xossasi, shor'lanish darjasи, shor'lanish tipi), gidrogeologik (sizot suvlari chuqurligi va oqib ketish sharoiti), iqlim (yog'ingarchilik miqdori, havoning harorati) yerning zovurlashtirilishi va agrotexnik sharoitlariga bog'liq bo'ladi [4,5,6].

Mexanik tarkibi yengil tuproqlarda tuzlar kam suv sarflanganda ham tez yuviladi. Aksincha mexanik tarkibi o'g'ir, zichlashgan, tuproq tarkibida suv o'tkazmaydigan gipsli yoki karbonatli qatlamlar bo'lganda tuzlar juda kam va uzoq muddatda yuviladi.

Mexanik tarkibi yengil tuproqlarga qaraganda, mexanik tarkibi og'ir, zich tuproqlarda tuz kam va qiyin yuviladi. Tuproqning tagida qum qatlamlar joylashganda, sho'r yuvish osonlashadi, zich soz qatlamlar joylashganda esa qiyinlashadi.

Tuproq gips yoki gips qatlamlari bo'lgan yoki haydalma tagi zichlashgan tuproqlarda sho'r yuvish juda sekinlashadi. Bunday qatlamlar bo'lgan tuproqlar maxsus yumshatgich quollar bilan yumshatilsa, sho'r yuvish samaradorligi ancha oshadi.

Tarkibida qumoq, yengil va o'rtacha qumoq ko'p bo'lgan donador uvoqli tuproq va gruntlar kam suv sarf qilgan holda jida tez yuvilib shorsizlantiriladi.

Tuproqda katta-katta yoriqlar, o'pqonlar, g'ovaklar ko'p bo'lganda u yaxshi yuvilmaydi, chunki bunday yerlarda suv shu yoriqlar, o'pqonlar, g'ovaklar orqali shimalib ketadi [1,2].

Sho'r yuvish samaradorligi tuproqning agregat holati va uning namligiga ham bog'liq bo'ladi. Nam tuproqqa qaraganda quruq tuproqlardan tuz kamroq yuviladi. Tuproq aggregatlari qanchalik mayda bo'lsa, tuz ham shuncha oson yuviladi.

Suvning sho'r yuvish samaradorligi tuproqning sho'rланish darajasiga ham bog'liq bo'ladi.

Tuproqda tuz qanshalik ko'p bo'lsa, uni yuvish ham shunchalik qiyinlasadi.

Sho'r yuvish samaradorligi tuproqdagagi tuzlarning tarkibiga ham bo'g'liq. Tuproq tarkibida xloridlar ko'p bo'lsa, ular oson yuviladi, chunki xloridli tuzlar suvda oson eriydi.

Sulfatli sho'rланish tiplarida tuzlar xloridli sho'rланish tuproqlarga nisbatan kamroq yuviladi. Chunki sulfatlar suvda kam eruvchan, ayniqsa past haroratda kam harakatchan.

Sizot suvi sathi 1,5-3,0 m joylashganda mexanik tarkibi og'ir bo'lgan tuproqlarning sho'rsizlanish jarayoni ham juda sust bo'ladi. Bung sababi, sizot suv sathi yuza joylashganda tuproqning erkin sig'imi juda kichik bo'lib, unga juda kam suv sig'adi, sizot suv oqimimning tezligi esa juda sekin bo'ladi. Bunday sharoitda sho'r yuvish ham ancha qiyinlashadi, chunki tuproq kapilyar namlik bilan kuchli to'yingan bo'ladi. Sizot suv sathi yuza joylashgan yerlarni sug'orish natijasida bir sug'orishdan ikkinchi sug'orishgacha bo'lgan davrda va sug'orishdan keyin ham tuproq qayta sho'rланib qoladi. Ayniqsa, yer chuqur sho'rsizlantirilmagan shor yuvish davrida sizot suv sathi sekin pasaytirilganda tuproq qaytadan juda tez sho'rланadi.

Sho'r yuvish samaradorligi yerning zovurlashtirish darajasiga ham bog'liq bo'ladi. Sho'ri yuviladigan maydon qanchalik ko'p zovurlashtirilgan bo'lsa, sho'r yuvish ta'sirida tuproq shunchalik yaxshi sho'rsizlanadi. Zovurlashtirilgan sharoitda zovurlashtirilmagan shoroitga qaraganda sho'r yuvish me'yori bir xilda bo'lishi yoki kam suv sarflanishi mumkin, lekin tuproqning chuqur qatlamlari ham yaxshi sho'rsizlanadi.

Kam sho'rланган yengil mexanik tarkibli tuproqlarda joriy sho'r yuvish erta bahorda (mart), o'rtacha va kuchli sho'rланган, mexanik tarkibi o'g'ir tuproqlarda esa oktyabr, dekabr, yanvar va fevral oylarida o'tkazish maqsadga muvofiq. Kuz-qish fasllarida sho'r yuvilganda umumiy sho'r yuvish me'yorlarining 2/3 qismi kuchli sovuq tushgunga qadar, qolgan 1/3 qismi bahor faslida bajariladi [3,6,7].

Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarni amalgaga oshirishda, birinchi navbatda, meliorativ tadbirlarga muhtoj tuproqlarni to'g'ri tanlash muhim hisoblanadi, bu masalaga quyidagi ilmiy-amaliy tomonlardan majmuaviy yondashish zarur.

1. Sizot suvlarining ko'tarilishi va u bilan bog'liq ikkilamchi sho'rланish jarayonlarining oldini olish uchun sug'orish suvlaridan me'yorida foydalanish, kanallar sug'orish tarmoqlari va latok tizimlarini texnik qayta jihozlash va sifatli ta'mirlash, ekinlarni sug'orishda tuproq-iqlim sharoitlari, ekinlar turi, vegetasiya (o'sish) davri, suvga talabchanligi, sizot suvlarining chiqurligi va boshqa omillarni hisobga olgan holda, sug'orish muddatlari, soni va me'yorlarinin to'g'ri belgilash, sug'orish rejimlariga qat'iy rioya qilish;

2. Sho'r yuvishda tuproqlarning sho'rланish darajasi, mexanik tarkibi, suv o'tkazuvchanligi (suv-fizik xossalari) hamda ildiz tarqaladigan qatlAMDAGI (0-1 m) tuzlar miqdori va zahiralari hisobga olinishi zarur. Sho'r yuvish uchun suv me'yorlari mexanik tarkibiga qarab turlicha sarflanadi. Tuproq mexanik tarkibiga ko'ra, yengil qatlamlili tuproqlarda o'rtacha 3000-3500 m³/ga, ortacha sho'rланган yerlarda 2-3 marta suv bostirish orqali 3500-5000 m³/ga, kuchli sho'rланган yerlarda 3 marta suv bostirish orqali 4000-5000 m³/ga, juda kuchli sho'rланган turli mexanik tarkibdagi tuproqlarda marzalar (cheklar) ga 3-4 marta suv bostirish orqali 5000-6500 m³/ga hamda kuchli va juda kuchli sho'rланган o'g'ir mexanik tarkibli tuproqlarda 3-4 marta suv bostirish orqali 6000-7500 m³/ga me'yorlarida sho'ri yuviladi. Sho'r yuvishdan keyingi tuproqdagagi tuzlar miqdori xlor ioni 0,01 % gacha va quruq qoldiq miqdorini 0,4-0,6 % gacha kamaytirish;

3. Mavsum davomida to'plangan tuzlarni tuproqning ildiz qatlamida yo'qotish faqat sho'r yuvish yo'li bilan amalgaga oshiriladi. Ayrim holatlarda qadimdan sug'oriladigan yerlarda bunga yuqori normalardagi sug'orish suvlarini berish orqali erishiladi. Agar sho'rланган hududlarda sug'orish suvlarini miqdori kamaytirilsa, unda o'simliklar kerakli namlikni sizot suvlarini zahiralardan oladi. O'simliklar tomonidan sizot suvlarini iste'mol qilish me'yorlari ularning joylashish chiqurligi, minerallashganlik darajasi va sug'orish suvlarining miqdori ko'rsatkichlariga bo'g'liq bo'ladi. Sug'orish suvlarini me'yorlari qancha yuqori bo'lsa o'simliklar sizot suvlarini shuncha kam iste'mol qiladi, mavsum davomida tuproqning ildiz qatlamida tuzlar kam to'planadi;

4. Tuproq sho'rланishini sodir etuvchi ko'plab omillar ichida yer osti grunt suvlarining "kritik chiqurligi" va "kritik minerlaizasiyasi" tushunchalariga alohida e'tibor qaratish zarur. Quruq va jazirama issiq iqlimli sug'oriladigan yerlari tuproq yuzasidan bug'lanishning atmosfera yog'inlaridan bir necha o'n barobar ko'p bo'lishi sharoitda, sho'rланish jarayoni sodir bo'lishi

muqarrar holat bo'lib, asosiy meliorativ tadbirlar ana shu salbiy jarayon oldini olishga, uning o'simliklarga ko'rsatadigan ta'sirini kamaytirishga yo'naltirish lozim.

5. Ayrim sugoriladigan yerlarda keng tarqalgan, g'oza hosildorligi 12-15 sentnerdan oshmaydigan, meliorasiyalash va qayta o'zlashtirish davri 6-8 yilni tashkil etadigan, qiyin meliorasiyalanuvchi, gipsli qatlamlar yer yuzasiga (0-50 sm) yaqin joylashgan, sho'rangan, murakkb agrotexnik va meliorativ tadbirlar kompleksini talab etuvchi unumdorligi va mahsuldorligi past yerlarga mahalliy (organik) o'g'itlar solish (30-40 n/ga), chuqur yumshatish (60-70 sm), sho'rini yuvish, keying 1-2 yil ichida "o'zlashtiruvchi" ekinlar ekish, siderat o'simliklar yetishtirish va uni "ko'k massa" holida shudgor ostiga ko'mish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Faafurova L.A., Abullaeva C.A., Namozov X.K. Meliorativ tuproqshunoslick. Toшkent. "Ўзбекистон Миллий энциклопедияси" Тошкент, 2003. б. 45-55
2. Toжiev У., Намозов X., Нафетинов Ш., Умаров К. Ўзбекистон тупроклари "Ўзбекистон Миллий энциклопедияси". Тошкент, 2004 й. б.67-75
3. Юнусов Р., Икромова Л., Умаров К. Бухоро вилоятида сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш чора-тадбирлари. "Ўзбекистон тупрокшunoслар ва агрокимёгарлар жамиятининг IV курилтойи материаллари". Тошкент, 2005 й. б.172-73
4. Артикова X.T., Каримов Э.К., Назарова С.М. Салимова X.X. Бухоро воҳаси шўрланган тупроклари ва уларнинг ҳолатини яхшилаш. "Хоразм Маъмун Академияси ахборотномаси". Журнал. №3/2017 (сентябр) б.7-10.
5. Артикова X.T., Юнусов Р. "Тупрок унумдорлигини ошириш, саклаш, муҳофазалаш ва қайта тиклашдаги муаммолар ва ечимлар". Республика илмий-амалий анжуман.-Бухоро, 2018 йил 5-6 апрель, б 252.
6. Ўзбекистон сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати ва уларни яхшилаш ҳолати. Ўзбекистон Республикаси ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси. Илмий тасиянома. Тошкент, 2018 й. 189-202 б.
7. Намозов X.K., Амонов О.С., Нафетдинов Ш.Ш., X.X.Салимова. Бухоро воҳаси сугориладиган ерларнинг тупроқ-мелоратив тавсифи. "Хоразм Маъмун Академияси ахборотномаси". Журнал. №8 (65)/2020. б.235-241

UDC: 631/635

CURRENT SITUATION OF PASTURE USE IN BUKHARA REGION

F.Sh. Khudoyberdiyev, teacher, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers Bukhara Branch, Bukhara

S.U. Bobojonov, student, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers Bukhara Branch, Bukhara

K.M. Mukhamadov, student, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers Bukhara Branch, Bukhara

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyatida yaylovlar degradatsiyasidan foydalanish, yaxshilash va oldini olish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ratsional, resurslar, yaylov, geobotanika, differential, suv resurslari, mahsulotlar

Аннотация. В данной статье представлены предложения и рекомендации по использованию, улучшению и предотвращению деградации пастбищ в Бухарской области.

Ключевые слова: рациональное, ресурсы, пастбище, геоботаника, дифференциал, водные ресурсы, продукты

Abstract. This article provides suggestions and recommendations on the use, improvement and prevention of pasture degradation in the Bukhara region.

Keywords: rational, resources, pasture, geobotanica, differential, water resources, products

Introduction. Limited land and water resources, population growth and industrial development in our country are leading to a growing demand for meat and meat products. This is the main task today, the development of modern advanced technologies, high yields from existing pastures and hayfields, as well as efficient and rational use.

The total area of land within the administrative-territorial boundaries of the Republic is 44896.9 thousand hectares, of which 21010.1 thousand hectares or 46% are pastures and hayfields. These pastures and hayfields are the main fodder base for livestock development and are an important natural resource for meeting the population's demand for livestock products such as meat, milk, wool and leather. Therefore, it is necessary to develop a science-based action plan to study the natural pastures and hayfields of the country, the flora growing here and increase the efficiency of their use.